

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Bei Fragen oder auftretenden Nebenwirkungen holen Sie bitte medizinischen Rat ein.

# HANOSABAL

Homöopathisches Arzneimittel

## Zusammensetzung:

1 g (entspricht ca. 1,10 ml) enthält die Wirkstoffe:

Sabal serrulatum Ø	3,0 mg
Arctostaphylos uva-ursi Ø	3,0 mg
Conium maculatum Ø	0,2 mg
Pareira brava Ø	10,0 mg
Acidum nitricum Dil. D1	1,0 mg
Rhododendron Ø	1,0 mg
Iodum Dil. D2	1,0 mg
Silicea Dil. D8	3,3 mg

Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), gereinigtes Wasser (1 g entspricht 46 Tropfen)

## Darreichungsform und Packungsgröße:

Mischung

50 ml zum Einnehmen

## Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

HANOSAN GmbH, Hanosanstraße 1, D-30826 Garbsen  
Telefon 05131 / 45930, Fax 05131 / 459345

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Hinweis: Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

## Gegenanzeigen:

HanoSabal darf nicht eingenommen werden in der Schwangerschaft und Stillzeit, bei Kindern unter 12 Jahren.

Bei Jodüberempfindlichkeit und bei Überempfindlichkeit gegenüber Sägepalmenfrüchten. Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.

## Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Dieses Arzneimittel enthält 57 Vol.-% Alkohol.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

## Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

## Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker.

## Beeinflussung der Wirkung von anderen Arzneimitteln:

Nicht bekannt.

## Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:

**Soweit nicht anders verordnet** gilt für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

## Dauer der Anwendung:

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne medizinischen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

## Nebenwirkungen:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren homöopathisch erfahrenen Therapeuten befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit:

Dieses Arzneimittel soll nach Ablauf des auf dem Behältnis und der Verpackung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Vor Gebrauch schütteln.

Nicht über 25 °C lagern!

## Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Stand der Information: April 2016

